Testbeleid en inzet medewerker COVID-19

Versie 28-12-2021

1

Heb je klachten passend bij COVID-19?
Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of verhoging/koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak
Of andere klachten zoals algehele malaise, hoofdpijn, spierpijn, pijn achter de ogen, vermoeidheid en verminderde eetlust.

Klachten ontstaan <48u na vaccinatie (vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, rillingen en koorts) en deze verdwijnen.

- **Nee** → **Laat je direct testen en blijf thuis.** Neem contact op met je leidinggevende.
- **Ja, geen actie**

Positieve testuitslag:

Thuisisolatie tot 48 uur koortsvrij EN ten minste 24 uur symptoomvrij EN minimaal 7 dagen na de start van de symptomen.

Start symptomen: 1e ziektedag (niet bekend dan dag van testen).

Koortsvrij: <38°C (zonder koortsremmende medicatie).

Symptoomvrij: geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid.

2

Geen klachten, maar wel:

Positief getest? → **Thuisisolatie:**
Gedurende 7 dagen na testafname
(indien klachten ontwikkelen, isolatie zo nodig verlengen tot 48u koortsvrij EN 24 uur symptoomvrij)

Positieve huisgenoot?
Let op: De kans dat huisgenoten van een COVID-19-patiënt ook besmet raken is erg groot.
RIVM categorie 1

Positief getest nauw contact?
RIVM categorie 2
Of
Melding in CoronaMelder-app?
RIVM categorie 2

Je inzet is absoluut noodzakelijk om de continuïteit van de patiëntenzorg te garanderen (iom leidinggevende)
EN
Je hebt géén klachten
EN
Je hebt de boostervaccinatie ontvangen of <3 maanden geleden een covid-19 infectie doorgemaakt of primaire vaccinatieserie voltooid.

- **Nee** → **Blijf thuis in thuisquarantaine*.** Neem contact op met je leidinggevende.
- **Ja** → **Je mag werken met chirurgisch masker** Zorg altijd voor een goede handhygiene, >1,5m afstand en reiniging werkplek!

Testen op Dag 0 en 5

(testen niet nodig indien <8 weken geleden COVID+)

Testuitslag

Positieve testuitslag:

Thuisisolatie:
Gedurende 7 dagen na testafname
(indien klachten ontwikkelen, isolatie zo nodig verlengen tot 48u koortsvrij EN 24 uur symptoomvrij)

Negatieve testuitslag:

Je kunt werken met goede basishygiëne

Medewerker zonder klachten draagt chirurgisch masker tot dag 10

Bij (verergering of verandering) klachten: **opnieuw testen**

Teruggekeerd uit een zeer hoog risicogebied
Maatregelen voor overige risicogebieden (zie www.rijksoverheid.nl)
Draag tot dag 10 na terugkeer uit hoog of zeer hoog risicogebied een chirurgisch masker
RIVM categorie 2

→ **Blijf thuis in thuisquarantaine*.** Neem contact op met je leidinggevende.

* *In uitzonderingssituatie kan de cruciale (zorg)medewerker werken met PBM (chirurgisch mondneusmasker type IIR en handschoenen bij zorghandelingen).*
Neem in overweging mee: medewerker heeft boostervaccinatie gehad, medewerker heeft geen klachten, medewerker wordt aaneengesloten periode ingezet op dezelfde afdeling.
Zorg altijd voor een goede handhygiene, >1,5m afstand en reiniging werkplek!

Thuisquarantaine: Lukt het niet om thuis 1,5m afstand te houden en zo weinig mogelijk in dezelfde ruimte te zijn, dan wordt geteld vanaf de laatste dag van de besmettelijke periode van de huisgenoot.

Algemene voorwaarden:
Volg de infectiepreventie maatregelen en bijbehorende persoonlijke beschermingsmiddelen volgens het (bovenregionale) veiligheidsniveau vastgesteld binnen de zorginstelling

Maak je bij het uitvoeren van je werkzaamheden zorgen omdat je een chronische ziekte hebt of medicijnen gebruikt die het afweersysteem negatief beinvloeden zoals: diabetes, COPD, gebruik van immunosuppressie, gebruik van chemotherapie of hart- en vaatziekten?
Doorverwijzing naar de (bedrijfs)arts. Maak afspraken over je inzetbaarheid met je leidinggevende.