

Dubbelcheck medicatie



Doel:

Om de patiëntveiligheid verder te verhogen bij het bereiden van de medicatie of infusie vloeistoffen. Dit door middel van een dubbele controle.

Doelgroep:

Anesthesiologen, anesthesiemedewerkers, verpleegkundigen

Verantwoordelijk:

Al het medische personeel betrokken bij medicatietoediening aan een patiënt.

Werkwijze:

Het dubbel checken van OK medicatie vindt d.m.v. twee simpele stappen plaats en dient te worden verricht door twee personen.

Hygiëne:

De handen moeten worden gedesinfecteerd met handen alcohol (30 seconden wrijven). De persoon die de medicatie optrekt draagt onsteriele handschoenen. De ampullen met rubber dopjes worden eerst afgenomen met alcohol swab.

Werkwijze:

- **Stap 1: Dubbelcheck bij voorbereiden medicatie**
Voor de algehele anesthesie of voor het onderhouden daarvan maakt de verantwoordelijke met een collega* de medicatie gereed. Het betreffende medicament wordt aangegeven door de collega en na verificatie van juistheid medicatie, concentratie en houdbaarheidsdatum opgezogen door de verantwoordelijke. De spuit moet in alle gevallen voorzien worden van een medicatiesticker waarop de medicatiennaam, dosering, datum, tijd en twee maal paraaf op vermeld staan. Per opgetrokken spuit wordt deze klaar gelegd op de Q-Check en de bijbehorende ampul komt erachter te staan.
- **Stap 2: Dubbelcheck bij toedienen van medicatie**
Voordat toediening aan de patiënt plaatsvindt, controleert de anesthesioloog/anesthesie- of verpleegkundige of het juiste label staat vermeld op de spuit. De ampullen dienen bewaard te blijven totdat de spuiten zijn gebruikt en vervolgens te worden weggegooid in de daarvoor bestemde scherpcontainer.
- De gebruikte spuiten worden niet teruggelegd op de Q-check maar bewaard (spuit met afsluitdop of naald) in een bekken op het anesthesie toestel. De propofol spuit welk is gebruikt voor inleiding dient te worden weggegooid, echter gefractioneerd geven van propofol tijdens inleiding is toegestaan mits de spuit na inleiding wordt weggegooid!

- Het is (vlg. IGZ) toegestaan voor nood een extra spuit propofol op te trekken deze mag niet gebruikt worden voor inleiding van een volgende patiënt
- De gebruikte en geparafeerde spuiten worden weggegooid als de patiënt de OK verlaat of worden meegegeven met de patiënt als deze naar de recovery gaat in een bekken met patiënten sticker.
- Aan het eind van de dag dient de nog resterende medicatie te worden vernietigd!
- Bij een spoedsituatie mag er van het protocol worden afgeweken

Bron:

IGZ. Standaardisatie onmisbaar voor risicovermindering in operatief proces;
Den Haag 10 december 2013