

Selectiecriteria voor behandelingen onder algehele anesthesie bij SBT

Algemeen:

- ASA > II
- Leeftijd > 70 jaar, Leeftijd < 3 jaar
- Kwetsbaarheidsscore ≥ 1 , dementie
- BMI ≥ 35
- Kinderen ≤ 10 kg
- GFR ≤ 35
- Zwangerschap
- DM, tenzij door orale therapie goed gereguleerd
- Kinderen met Diabetes
- Temperatuur $>38^{\circ}\text{C}$
- Verslaving aan alcohol/drugs (**relatief**)
- Sikkelcel anemie (relatief)
- Recente vaccinatie: BMR < 2 weken, Andere vaccinaties < 2 dagen (**relatief**)
- Kinderen met Sudden Infant Death in de familie?

Luchtweg:

- Patiënten met een eerdere moeilijke intubatie of te verwachten moeilijke intubatie
- Na radiotherapie van mondbodem/oropharynx/parotis
- Ernstig Rheuma

Cardiaal:

- PM/ICD
- Matig tot ernstig coronarialijden
- Matig tot ernstig klepvitium
- QT syndromen
- Ritmestoornissen(**relatief**).

Pulmonaal:

- Matige tot ernstige COPD: - Matige COPD GOLD 2: FEV1/FVC < 70%
50% < FEV1 < 80%
- Ernstige COPD GOLD 3: FEV1/FVC < 70%
30% < FEV1 < 50%
- Zeer ernstige COPD GOLD 4: FEV1/FVC < 70%
FEV1 < 30% of FEV1 < 50 met zuurstof.
- Ernstige hyperreactiviteit
- Frequentie exacerbaties (> 3 x p/j)
- Bronchitis , Pneumonie
- Nicotine Abuses

Neurologisch:

- Spierziekten
- Maligne Hyperthermie in voorgeschiedenis of bekend in familie
- Moeilijk instelbare grand mal aanvallen. < 3 maanden aanvalsvrij
- Centrale apneu

Medicatie :

- MAO-remmers, Lithium gebruik

Syndroomaal :

- Syndroom van Rett
- Syndroom van Prader Willi/ Angelman

Stolling :

- Stollingsafwijkingen (relatief)
- Gebruik coumarinederivaten en NOAC (**relatief**)

Sociaal:

- Onvoldoende begeleiding naar huis
- Geen postoperatieve aanwezigheid dag en avond na de ingreep

Chemie: - Na < 130 mmol/L