

Aan te houden interval tussen vaccinatie met dode/ geïnactiveerde en levend verzwakte vaccins en anesthesie/ chirurgie			
Interval vaccinatie en anesthesie/chirurgie	2 dagen 48 uur	2 weken 14 dagen	geen interval
Soorten vaccins	Dode/geïnactiveerde vaccins	Levende verzwakte vaccins	
	DKTP	BMR	BCG (levend verzwakt)
	HepA	Gele koorts	RS virus(passieve immunisatie met antistoffen)
	HepB	OPV (enkel in het buitenland)	
	HIB	Rota	
	HPV	Varicella	
	Influenza		
	IPV		
	MenC		
	Pneu		
	tetanus		

BCG ^[L] _{SEP}	Bacillus Calmette-Guérin = Tuberculose vaccin
BMR	Bof, Mazelen, Rubella = Rode hond vaccin
DKTP ^[L] _{SEP}	Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Poliomyelitis vaccin
Gele koorts	Gele koorts vaccin
HepA	Hepatitis A vaccin
HepB	Hepatitis B vaccin
Hib ^[L] _{SEP}	Haemophilus influenzae type b vaccin ^[L] _{SEP}
HPV ^[L] _{SEP}	Humaan Papilloma Virus vaccine
Influenza ^[L] _{SEP}	Griepvaccin ^[L] _{SEP}
IPV Inactivated Polio Vaccin ^[L] _{SEP}	
MenC ^[L] _{SEP}	Meningococcon sero groep C vaccine ^[L] _{SEP}
OPV ^[L] _{SEP}	Oraal Polio
Pneu ^[L] _{SEP}	Vaccin ^[L] _{SEP} geconjugerd (Previnar) en ongeconjugerd (Pneumovax) Pneumococcon vaccin
Rota ^[L] _{SEP}	Rotavirus vaccin
Varicella	Waterpokken vaccine